Generic drug

is the best solution to optimize the healthcare cost

m-generic

High Quality Generic Distribution

Table of contents

Allergologie 1

M-Ceftriaxone 1g 1

M-Cetirizine 4

M-Chlorphenamine 5

M-Ginkgo 9

M-Ketotifene Gelule 11

M-Ketotifene Sirop 13

M-Loratadine 17

Anti-inflammatoires 18

M-Diclofenac Gel 18

M-Diclofenac Injectable 22

M-Ibupara 24

Cardiologie 26

M-Captopril Plus 26

M-Nifedipine 28

Dermatologie 32

M-Alovera 32

M-Betamethasone 34

M-Betamethasone Neo 38

M-Clotrimazole 1% 40

Gastrologie 42

M-Antacid 42

M-Cimetidine 46

M-Domperidone 50

Gynecologie 51

M-Gynotab 51

M-Neomycine 55

M-Terbinafine 56

Infectiologie 58

M-Amoxicilline 125mg 58

M-Amoxicilline 250mg 60

M-Amoxicilline 500mg 62

M-Ciprofloxacine 500mg 63

M-Clarithro 250mg ... 65
M-Cotrimoxazole ... 67
M-Ketoco 200mg ... 69
M-Oflox 200mg ... 71
Metabolisme ... 73
Bevitazinc ... 73
Ferozinc B12 ... 74
M-Calcium Fort ... 76
M-Calcium Plus ... 77
Neurologie ... 81
M-Tramad 50mg ... 81
M-Valpro LP 200mg ... 83
Ophtalmologie ... 87
M-Chloramphenicol ... 87
M-Cipro 3% ... 89
M-Timol 0,5% ... 91
M-Tobradexa ... 92
Parasitologie ... 93
Paludoxine ... 93
Pneumologie ... 94
KOOK Expectorant Adulte ... 94
KOOK Expectorant Enfant/Nourrisson ... 95
M-Salbutamol ... 97

M-Ceftriaxone 1g - Ceftriaxone Injectable

INSTRUCTIONS FOR USE

PROPRIETES :Antibiotique bactéricide de la famille des bêtalactamines (du groupe des C3G

Céphalosporines de 3ème génération) ayant un très large

spectre.

INDICATIONS :
Infections

sévères dues à des germes sensibles, dont septicémies,

pneumonies et méningites. Utilisé en antibiotique de reserve lors de

méningites à streptocoque pneumoniae.
Traitement de la maladie de

Lyme.
Prophylaxie pré-opératoires. Prophylaxie de méningites

à meningocoque. Gonorrhée.

POSOLOGIE :
En

injection intra-musculaire profonde, en injection intraveineuse (au moins 2 à 4

minutes) ou en perfusion intraveineuse (au moins 60 minutes).
Adulte 1g par jour ;

lors d'infection sévère 2 à 4g par jour ; Enfant de moins de 50kg

20 à 50mg/kg par jour ; lors d'infection sévère jusqu'à

80mg/kg par jour (les doses de 50mg/kg et plus se feront par perfusion) ;

Nouveau-né 20 à 50mg/kg par jour au maximum.
Prophylaxie chirurgicale,

en injection intra-musculaire profonde ou en injection intraveineuse (au moins 2 à 4

minutes) : adult 1g à l'induction.
Gonorrhée simple, en injection

intra-musculaire profonde : adult 1g en une dose unique.
Chirurgie colorectale (avec

antibiotique actif contre les anaerobies), en injection intra-musculaire profonde ou en

injection intraveineuse (au moins 2 à 4 minutes) Adult 2g en une dose

unique.
CONTRE-INDICATIONS :
Allergie aux

céphalosporines et aux pénicillines.
Porphyrie ; nouveau-né

atteint de jaunisse.

INTERACTIONS :L'association avec des anticoagulants oraux, la vancomycine, le fluconazole et des

aminosides est déconseillée. M-Ceftriaxone ne doit pas être

mélangé à des solutions contenant du calcium.
PRECAUTIONS D'EMPLOI :
Déficience rénale

sévère ; Chez les prématurés ; en traitement de plus de 14

jours ; éviter lors de grossesse et la période d'allaitement.
EFFETS INDESIRABLES :
Diarrhée,

nausée, vomissement, gêne abdominale.

CECI EST UN

MEDICAMENT
NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS
Conservation dans un

endroit sec et frais.

M-Cetirizine - Cetirizine comprime

INSTRUCTIONS FOR USE

PROPRIETES :
Antihistaminique sélectif des

récepteurs H1 périphériques.

INDICATIONS :
Pour le traitement symptomatique des rhinites

allergiques, urticaire aiguë et conjonctivites allergiques.

POSOLOGIE :
Adulte et enfant de plus de 12 ans : 1

comprimé par jour en une seule prise.
Enfant de 6 à 12 ans: 1

comprimé par jour en 1 ou 2 prises.

CONTRE-INDICATIONS :
Hypersensibilité à la

substance.

INTERACTIONS :
Aucune.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :
La

cétirizine doit être évitée durant les 12 premières

semaines de grossesse et durant la période d'allaitement.

EFFETS INDESIRABLES :
Possibilité de troubles

digestifs, de bouche sèche, de vertiges.
Réactions cutanées et

possibilité de somnolence chez l'enfant.

M-Chlorphenamine - Chlorphenamine comprimé

INSTRUCTIONS FOR USE

PROPRIÉTÉS
Antihistaminique par

action sur les récepteurs
H1 périphériques.
Effet

atropinique et sédatif.

INDICATIONS
Traitement des

réactions allergiques :
Rhume des foins, coryza, trachéites.Oedème de Quincke.
Manifestations allergiques alimentaires oumédicamenteuses.
Piqûres d'insectes, urticaires,

démangeaisons.

POSOLOGIE
Adulte : 2 à 4

comprimés par jour à répartir en
3 prises.
Enfant de plus de

6 ans : 1 à 2 comprimés par
jour.
CONTRE-INDICATIONS
Glaucomes.
Troubles

urétro-prostatiques.

INTERACTIONS
Alcool :

majoration par l'alcool de l'effet
sédatif de la

chlorphéniramine.
Atropine et dérivés : addition des effets

indésirables
à type de rétention urinaire, constipation,sécheresse de la bouche.
Dépresseurs du SNC : majoration des effetsde la dépression centrale.

PRÉCAUTIONS

D'EMPLOI
Ne pas utiliser ce produit pendant le premier
trimestre

de la grossesse.

Tenir compte du risque de somnolence consécutif
à

l'emploi de ce produit.
Absorption d'alcool. Prise de barbituriques.
EFFETS INDÉSIRABLES
Somnolence. Effets atropiniques

à type de :
rétention urinaire, sécheresse de la bouche,

viscosité
des sécrétions bronchiques, troubles del'accommodation, constipation, confusion mentale
ou excitation chez le sujet

âgé.

M-Ginkgo - Ginkgo Comprimé

INSTRUCTIONS FOR USE

PROPRIETES :
Amélioration de la capacité de

circulation périphérique et stimulation de l'activité des cellules

nerveuses.

INDICATIONS :
Améliorations

dans la maladie d'Alzheimer, augmentaion de la mémoire et de la capacité

de concentration, atténuation des syndromes pré-menstruels,

dégénérescence maculaire, certains types de vertiges,

amélioration du glaucome.

POSOLOGIE :
1

à 2 comprimés 3 fois par jour pendant au moins 4 semaines.
CONTRE-INDICATIONS :
Hypersensibilité au produit.
INTERACTIONS :
Les extraits de Ginkgo Biloba ne

devraient pas être utilisés avec des anti-coagulants tels que héparine

ou warfarin. Des interactions défavorables ont été enregistrées

lors de prise avec de l'aspirine.

PRECAUTIONS

D'EMPLOI :
Le Ginkgo est un fluidifiant du sang et ne devrait pas

être utilisé en cas de troubles hémorragiques tel

l'hémophilie ou en chirurgie ou lors d'accouchement.
EFFETS INDESIRABLES :
Extrémement rares gênes

gastro-intestinales ou maux de tête.

M-Ketotifene Gelule - Ketotifene gelule

INSTRUCTIONS FOR USE

PROPRIETES

:
Antihistaminique sélectif des récepteurs H1

périphériques à usage systémique.
Possède des

propriétés antiallergiques.

INDICATIONS

:
Traitement préventif de l'asthme bronchique allergique et des

manifestations d'hypersensibilité.

POSOLOGIE :Les gélules seront à avaler avec un grand verre d'eau au milieu

d'un repas.
Adulte et enfant de plus de 6 ans : 1 gélule matin et soir.En raisons des risques de somnolence, débuter le traitement par 1

gélule le soir, pendant quelques jours. L'action prophylactique s'installe

après 4 semaines de traitement, l'effet protecteur maximal après plusieurs

mois de traitement.

CONTRE-INDICATIONS :Hypersensibilité à la substance.
INTERACTIONS :
L'alcool augmente les effets sédatifs

des antihistaminiques H1.
L'association avec l'atropine et autres

dépresseurs du système nerveux central est déconseillée.
PRECAUTION D'EMPLOI :
L'absorption

d'alcool est fortement déconseillée durant la période de

traitement.
A éviter durant la grossesse (24 premières semaines) et la

période de d'allaitement.

EFFETS INDESIRABLES :Possibilité de somnolence, de troubles digestifs, de prise de poids.Chez l'enfant, possibilité d'excitation, d'irritation et de

nervosité.

M-Ketotifene Sirop - Ketotifene sirop

INSTRUCTIONS FOR USE

PROPRIETES

:
Antihistaminique sélectif des récepteurs H1

périphériques à usage systémique.
Possède des

propriétés antiallergiques.

INDICATIONS

:
Traitement préventif de l'asthme bronchique allergique et des

manifestations d'hypersensibilité.

POSOLOGIE :Adulte et enfant de plus de 3 ans : 5ml (1 cuillère à café)

matin et soir.
Enfant de 6 mois à 3 ans : demi-dose matin et soir.
En

raisons des risques de somnolence, débuter le traitement par 5ml le soir,

pendant quelques jours. L'action prophylactique s'installe après 4 semaines de

traitement, l'effet protecteur maximal après plusieurs mois de traitement.
CONTRE-INDICATIONS :
Hypersensibilité

à la substance.

INTERACTIONS :L'alcool augmente les effets sédatifs des antihistaminiques H1.L'association avec l'atropine et autres dépresseurs du système

nerveux central est déconseillée.

PRECAUTION

D'EMPLOI :
L'absorption d'alcool est fortement

déconseillée durant la période de traitement.
A éviter

durant la grossesse (12 premières semaines) et la période de

d'allaitement.

EFFETS INDESIRABLES :Possibilité de somnolence, de troubles digestifs, de prise de poids.
Chez

l'enfant, possibilité d'excitation, d'irritation et de

nervosité.

M-Loratadine - Loratadine comprimé

INSTRUCTIONS FOR USE

PROPRIETES

:
Antihistaminique séléctif des récepteurs H1

périphériques.

INDICATIONS :Traitement symptomatique de la rhinite saisonnière pollinique, de la rhinite

apériodique, des dermatoses allergiques, de l'urticaire.
POSOLOGIE :
Adulte et enfant au-dessus de 12 ans (ou plus de

30kg) :
1 comprimé par jour de préférence le matin au

moment du petit-déjeuner.

CONTRE-INDICATIONS

:
Hypersensibilité au produit.
INTERACTIONS :
Aucune.
PRECAUTIONS D'EMPLOI :
Chez l'enfant de moins de 12

ans.

EFFETS INDESIRABLES :
Les effets

indésirables à type de bouche sèche, fatigue, somnolence et

céphalées sont rares.

M-Diclofenac Gel - Diclofenac Gel

INSTRUCTIONS FOR USE

PROPRIÉTÉS
Anti-inflammatoire non

stéroïdien (AINS).
Le gel, après massage, est absorbé

à travers la peau et le diclofénac se retrouve dans le liquide et les

tissus
synoviaux, et ce en concentrations largement supérieures
à

celles qui sont retrouvées dans le plasma.
INDICATIONS
M-Diclofénac gel dermique est utilisé en

applications externes pour soulager des douleurs et inflammations locales, les tendinites,

lumbago, arthrose.
OEdèmes post-traumatiques.

POSOLOGIE3 ou 4 applications par jour, avec massage léger de la zone douloureuse

ou inflammatoire.
Après pénétration du gel à travers la

peau, éventuellement mettre un bandage.
Réservé à

l'adulte et à l'adolescent.
CONTRE-INDICATIONS
Allergie au diclofénac et à tout

AINS.
Brûlures, dermatoses suintantes.

INTERACTIONSAucune.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOIGrossesse à partir de 6 mois et allaitement.
Association aux

Diurétiques.

EFFETS INDÉSIRABLES
De rares

réactions de type allergique peuvent apparaître,
tel que prurit ou

érythème.

CECI EST UN MEDICAMENT
NE PAS LAISSER A LA

PORTEE DES ENFANTS
Conservation dans un endroit sec et frais

M-Diclofenac Injectable - Diclofenac Injectable

INSTRUCTIONS FOR USE

PHARMACOLOGIE
Anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS)

avec un effet antalgique et antipyrétique.
Activité inhibitrice sur la

synthèse des prostaglandines.
Activité inhibitrice sur

l'agrégation plaquettaire.

INDICATIONSTraitement symptomatique des rhumatismes inflammatoires.
Tendinites,

périarthrites, lumbago, arthrose, accès de goutte.
Douleurs

post-traumatiques, post-opératoires, dentaires.
Crises de coliques

néphrétiques.

CONTRE-INDICATIONS
Allergie au

diclofénac et à tout AINS.
Insuffisance rénale ou

hépatique.
Enfant de moins de 15 ans.
INTERACTIONS
Il est fortement déconseillé

d'associer le diclofénac à l'aspirine ou tout autre AINS, aux

anticoagulants oraux, aux IEC.

PRÉCAUTIONS

D'EMPLOI
Grossesse à partir de 6 mois et allaitement.Association aux diurétiques, aux inhibiteurs de l'enzyme de conversion de

l'angiotensine (IEC).

EFFETS INDÉSIRABLESDouleurs épigastriques, nausées, vomissements. Rarement ulcère

peptique.
Réactions cutanées telles rash, prurit.
MODE D'EMPLOI
Une injection intra-musculaire profonde par

jour pendant deux jours
Si besoin est, relayer le traitement par la forme orale.

M-Ibupara - Ibupara comprimé

INSTRUCTIONS FOR USE

PHARMACOLOGIE
M-IbuPara est un

association d' ibuprofène et de paracétamol ayant tous deux des effets

analgésiques périphériques et antipyrétiques.
De plus

l'ibuprofène est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS), qui

possède une activité inhibitrice sur la synthèse des prostaglandines

et sur l'agrégation plaquettaire.

INDICATIONSM-IbuPara est indiqué dans le traitement symptomatique
des rhumatismes

inflammatoires, arthrose, crise de goutte.
Douleur et fièvre. Tendinites,

périarthrites, lumbago.
Dysménorrhées. Douleurs musculaires.
POSOLOGIE :
Posologie usuelle: 1 comprimé 3 à 4

fois par jour, pendant ou après les

repas.
CONTRE-INDICATIONS
Allergie à l'Ibuprofène,

à tout AINS et au paracétamol.
Ulcère gastro-duodénal

évolutif ou antécédent d'ulcère.
Insuffisance

rénale ou hépatique.
Enfant de moins de 15 ans.
INTERACTIONS
Risque d'hyperkaliémie lors

d'association avec les sels de potassium, les diurétiques

hyperkaliémiants.
Il est fortement déconseillé d'associer

l'Ibuprofène à
d'autres AINS, aux anticoagulants oraux, les

inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC), le triméthoprime.
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Déconseillé pendant

la grossesse et l'allaitement.
L'association avec les diurétiques doit se

faire sous
surveillance

M-Captopril Plus - Captopril Plus comprimé

INSTRUCTIONS FOR USE

PROPRIETES :
Association

fixe d'inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine I et II (IEC)

et de diurétique thiazidique.

INDICATIONS :Hypertension artérielle essentielle.
Pour une stabilité de

l'hypertension artérielle quand le captopril seul ou l'hydrochlorothiazide

seul ne sont pas suffisants.

POSOLOGIE :Avaler la dose prescrite pendant ou après les repas.
Le traitement

débutera généralement par la moitié de comprimé de

M-Captopril Plus, puis sera augmenté jusqu'à obtention de la baisse de

tension souhaitée.
La posologie efficace est de 1 à 2 comprimés

par jour, répartie le matin et le soir.
Cette posologie peut être

porté au-delà, sous stricte surveillance hématologique et

rénale.
La posologie maximum est de 3 comprimés de M-Captopril Plus par

jour.

CONTRE-INDICATIONS :
Grossesse,

allaitement.
Hypersensibilité au produit.

INTERACTIONS :
Les sels de potassium, les médicaments

d'épargne du potassium et les anti-inflammatoires non stéroïdiens

(AINS) associés au captopril augmentent le risque d'hyperkaliémie.Les sels de lithium associés au captopril augmentent le
risque

d'hyperlithémie.
Les sels de calcium associés à

l'hydrochlorothiazide augmente le risque de calcémie.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :
Anesthésie: risque

d'hypotension chez le patient sous captopril.
Corriger alors le manque de

sodium.
Association avec des immunosuppresseurs ou des

leucopéniants: un contrôle hématologique et rénal sera fait

avant et pendant le traitement.

EFFETS INDESIRABLES

:
Toux sèche, démangeaisons, éruption cutanée,

M-Nifedipine - Nifedipine comprimé

INSTRUCTIONS FOR USE

PROPRIÉTÉS
Antagoniste calcique appartenant

à la famille des
dihydropyridines.
Anti-angoreux.
Diminution du tonus

vasculaire artériel provoquant ainsi
une vasodilatation

périphérique et coronaire.

INDICATIONSPrévention de la crise d'angine de poitrine.
Angor stable en

association avec les Béta-bloquants.
Syndrome de Raynaud.
Crise

d'hypertension artérielle.

POSOLOGIE
1

à 4 comprimés par jour selon la gravité de l'affection.
CONTRE-INDICATIONS
Hypersensibilité à la

nifédipine.
Infarctus du myocarde datant de moins d'un mois.
Angor

instable.
Grossesse et Allaitement.

INTERACTIONSL'association avec d'autres antihypertenseurs peut
renforcer

leur action.
Association avec la cimétidine : augmentation del'effet hypotenseur de la nifédipine par inhibition du catabolisme de

la nifédipine.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOIPrudence est recommandée en cas de conditions hémodynamiques instables

(risque de :collapsus, hypovolémie, choc cardiogénique).
En cas

d'angor stable chez le coronarien, traiter préalablement par un

Béta-bloquant.
En monothérapie, la nifédipine n'est pas un

traitement
de la crise d'angor survenant à la phase aigue del'infractus du myocarde.

EFFETS INDÉSIRABLESGénéralement du fait de la vasodilatation périphérique,en particulier en début de traitement : oedème des
jambes,

céphalées, vertiges, nausées.

M-Alovera - Aloe vera extrait

INSTRUCTIONS FOR USE

PROPRIETES :
L'extrait d'aloe vera est un nutriment de la

cellule et un hydratant naturel pouvant restaurer et calmer. Par ses

propriétés anti-inflammatoires, il permet une hydratation de la peau et son

raffermissement.
La plante aloe a été utilisée depuis les temps

préhistoriques dans le traitement des brûlures, des plaies et autres

problèmes de peau.

INDICATIONS :
Dans

l'herpès génital, M-Alovera réduit le temps de guérison de

la plaie.
Lors de psoriasis légers à moyens , M-Elovera donne des

résultats significatifs.
Autres usages : peau sèche et

séborrhée, hyper-pigmentation, eczéma. Réduction des

vergetures, cicatrices de post-acné et autres cicatrices.
POSOLOGIE :
Appliquer tous les soirs pour une ré-hydratation

de la peau ou pour réduire les vergetures et cicatrices. Utiliser

régulièrement après le bain.
Lors d'herpès

génital, appliquer 3 fois par jour.
Lors de psoriasis, appliquer 3 fois par

jour pendant 4 semaines.

CONTRE-INDICATIONS :Sensibilité à tout composant.
INTERACTIONS :
Aucune

PRECAUTION

D'EMPLOI :
Usage externe uniquement. Eviter le contact avec les yeux.
EFFETS INDESIRABLES :
Aucun.

M-Betamethasone - Bétamethasone crème

INSTRUCTIONS FOR USE

PROPRIÉTÉS
Dermocorticoïde.Anti-inflammatoire et immunodépresseur à usage
local.
INDICATIONS
Eczéma.
Dermatites.Lichénification.
Psoriasis.

POSOLOGIE
Une

à deux applications quotidienne en couches
fines, en massant

légèrement jusqu'à absorption
entière du produit.Une augmentation du nombre d'applications
quotidiennes risquerait

d'aggraver les effets indésirables
sans améliorer les effets

thérapeutiques.

CONTRE-INDICATIONSHypersensibilité au produit.
Infections dermiques bactériennes,

virales, fongiques
ou parasitaires même s'il y a une composante

inflammatoire.
Peau lésée.
Acné.
Application sur les

paupières (risque de glaucome).

PRÉCAUTIONS

D'EMPLOI
Si une intolérance locale apparaît,

l'application du
produit doit être interrompue et remplacée par

un
traitement approprié.

EFFETS

INDÉSIRABLES
L'utilisation sur de grandes surfaces peut

entraîner
une absorption systémique avec cortico-dépendance :Syndrome cushinoïde et ralentissement de la

croissance chez l'enfant.

M-Betamethasone Neo - Bétaméthasone Néo Crème

INSTRUCTIONS FOR USE

PROPRIETES :
Dermocorticoïde

associé à un antibiotique.
Anti-inflammatoire, immunodépresseur

et anti-infectieux à usage local.

INDICATIONS

:
Eczéma, dermatites et psoriasis avec surinfection.
Le

traitement par l'association à l'antibiotique par rapport au

traitement par le corticoïde seul, n'est supérieur que la

première semaine et en cas de surinfection.

POSOLOGIE

:
Une à deux applications quotidiennes en couches fines, en massant

légèrement jusqu'à absorption entière du produit. Une augmentation du nombre d'applications quotidiennes risquerait d'aggraver

les effets indésirables, sans améliorer les effets thérapeutiques.
CONTRE-INDICATIONS :
Hypersensibilité au

produit.
Plaie atone, acné, escarres, ulcère de la jambe,

rosacée. Application sur les paupières (risque de glaucome).
RECAUTIONS D'EMPLOI :
En cas d'infections microbiennes,

suivre un traitement antibiotique approprié avant l'utilisation de ce

produit.
Si une intolérance locale apparaît, l'application du

produit doit être interrompue et remplacée par un traitement

approprié.

EFFETS INDESIRABLES : L'utilisation sur de grandes surfaces peut entraîner une absorption

systémique avec cortico-dépendance : Syndrome cushinoïde et

ralentissement de la croissance chez l'enfant.

M-Clotrimazole 1% - Clotrimazole crème

INSTRUCTIONS FOR USE

PROPRIETES :
Antimycosique, antifongique de la famille des

imidazolés, actif contre la plupart des champignons dont les candida et autres

levures.
Il a une activité antibactérienne contre les gram+.
INDICATIONS :
Traitement de pityriasis versicolor,

dermatophyties de la peau glabre, pied d'athlète, candidose des plis,

perlèche, vulvite et anite candidosiques, teigne.
POSOLOGIE :
Appliquer 2 fois par jour une quantité

suffisante sur la zone affectée.
Le traitement doit être poursuivi

pendant 2 à 4 semaines.

CONTRE-INDICATIONS

:
Hypersensibilité au clotrimazole ou à tout autre composant de

la crème..

INTERACTIONS :
Aucune.
PRECAUTIONS D'EMPLOI :
Eviter le contact avec

les yeux.
Déconseillé pendant le premier trimestre de grossesse.
Ne

pas utiliser seul dans les atteintes des ongles et les teignes.
EFFETS INDESIRABLES :
Les préparations topiques peuvent

provoquer sensibilisation et allergie, auquel cas le traitement doit être

arrété.

CECI EST UN MEDICAMENT, NE PAS LAISSER

A LA PORTEE DES ENFANTS

M-Antacid - Antacid comprimé

INSTRUCTIONS FOR USE

PROPRIÉTÉS
Pansement gastrique et

anti-acide.
Le gel d'hydroxide d'aluminium a un pouvoir couvrant et

adsorbant.
Le tri silicate de magnésium aussi, mais de plus il neutralise

l'hyper acidité gastrique.

INDICATIONSTraitement symptomatique des douleurs de l'estomac, du duodénum et de

l'oesophage.
Brûlures d'estomac.
POSOLOGIE
Croquer et bien mâcher 2 comprimés en cas de

douleur.
Si besoin, prendre jusqu'à 6 fois par jour 2

comprimés.

CONTRE-INDICATIONS
Insuffisance

rénale grave.

INTERACTIONS
Risque de surdosage de

la quinidine, par diminution de son excrétion
Diminution de l'absorption

de nombreux médicaments, tels que :
cyclines, fluoroquinolones,

béta-bloquants, glucocorticoïdes, chloroquine, ranitidine.
Prendre ces

médicaments à distance de M-Antacid (plus de 2h et plus
de 4h pour les

fluoroquinolones).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOIEviter la prise d'autres médicaments en même temps (voir

interactions).
Ce traitement symptomatique ne dispense pas d'un éventuel

traitement de fond par des anti-ulcéreux. En cas de douleurs persistantes, consulter

le médecin.

EFFETS INDÉSIRABLES
En cas

d'utilisation prolongée, il y a un risque de perte de phosphore.

M-Cimetidine - Cimetidine comprimé

INSTRUCTIONS FOR USE

PHARMACOLOGIE
Anti-ulcère

gastrique et duodénal par diminution des
sécrétions d'acide

gastrique. La cimetidine est active par
inhibition compétitive sur les

récepteurs H2 de l'histamine.

INDICATIONSUlcère gastrique et duodénal.
Remontées ou renvois acides

(pyrosis).
Syndrome de Zollinger-Ellison.
CONTRE-INDICATIONS
Hypersensibilité au produit. Insuffisance

rénale.

INTERACTIONS
La cimétidine est un

inhibiteur de certaines enzymes
hépatiques, pouvant ainsi provoquer une

augmentation de la concentration dans le sang de certains médicaments.Association déconseillée : Phénytoïne.
Association

nécessitant des précautions d'emploi :
anti-coagulants,

béta-bloquants, carbamazépine, nifédipine, théophylline.Association à prendre en compte : Benzodiazépines
(somnolence

accrue).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Eviter en

période de grossesse et d'allaitement.
Vérifier

l'authenticité de l'ulcère avant traitement.
EFFETS INDÉSIRABLES
Parfois : diarrhées, fatigue,

douleurs musculaires, vertiges, éruption cutanée.

MODE

D'EMPLOI
La dose habituelle est de 2 comprimés le soir, au

coucher en traitement d'attaque.
Le traitement sera de 4 semaines, au moins,

même si les signes disparaissent avant ce délai. En traitementd'entretien : 1 comprimé le soir.

M-Domperidone - Domperidone Suspension Buvable

INSTRUCTIONS FOR USE

PROPRIÉTÉS
M-Dompéridone est un

anti-émétique puissant, en s'opposant au reflux du contenu de

l'estomac. Par contre, la vitesse de vidange de l'estomac est

accélérée sans modifier les fonctions sécrétoiresIl normalise les spasmes de l'oesophage.

INDICATIONSTraitement symptomatique des nausées et vomissements.
Reflux

gastro-oesophagien.

POSOLOGIE
BIEN SECOUER LE FLACON AVANT

USAGE.
Nourrisson et enfant : 3 à 4mg / 5Kg par jour, répartis en 3

fois.
Adulte : 10ml (2 cuillères à café) 3 fois par jour.
CONTRE-INDICATIONS
Hypersensibilité au produit.Hémorragie gastro-intestinale, obstruction mécanique, perforation

digestive.

INTERACTIONS
Aucune.
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Chez l'insuffisant

hépatique.
Grossesse et allaitement.
EFFETS INDÉSIRABLESRarement, crampes abdominales passagères, réaction allergique.

M-Gynotab - Gynotab comprimé vaginal

INSTRUCTIONS FOR USE

PROPRIÉTÉS
Clotrimazole est de la famille

des imidazolés. C'est un antifongique actif contre la plupart des champignons

dont les Candida et autres levures. Il a une activité antibactérienne contre

les Gram+.
Tinidazole est aussi un imidazolé dont l'activité

antiparasitaire est forte contre Trichomonas vaginalis. Il a aussi une activité

antibactérienne.

INDICATIONS
Traitement local des

vaginites dues à des Trichomonas et /ou des champignons.
Vaginites

surinfectées ou non.
Vagintes non spécifiques.
POSOLOGIE
1 comprimé par jour le soir au coucher pendant 6

à 12 jours.

MODE D'ADMINISTRATION
Introduire

profondément dans le vagin le comprimé préalablement trempé

dans l'eau avec ou sans applicateur.
CONTRE-INDICATIONS
Allergie à l'un des composants.Utilisation de préservatif en latex.

INTERACTIONSAucune.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Arrêter

le traitement en cas d'irritation persistante et consulter le médecin
EFFETS INDÉSIRABLES
Parfois, sensation de brûlure ou

de démangeaison.

CONSEILS PRATIQUES
Toillette avec

un savon neutre ou alcalin.
Conseil d'hygiène : port de

sous-vêtements en coton, éviter les douches

vaginales et le port des

tampons internes pendant le traitement
Ne pas interrompre le traitement pendant les

règles.

M-Neomycine - Neomycine crème

INSTRUCTIONS FOR USE

PROPRIÉTÉS
Antibiotique bactéricide de la

famille des aminosides,
actif contre les staphylocoques.
INDICATIONS
Infection cutanée à staphylocoques :

furoncle,
anthrax, plaies et brûlures (en association avec uneantibiothérapie générale).
Surinfection de gale,

impétigo.

POSOLOGIE
Trois applications quotidiennes

en couches fines, en
massant légèrement jusqu'à absorption

entière du
produit.
La surface traitée ne doit pas être

étendue, en raison
du risque de résorption transcutanée.
Ne

pas utiliser plus d'une semaine.

CONTRE-INDICATIONSHypersensibilité à la néomycine et aux aminosides
Infection

mammaire en période d'allaitement.

PRÉCAUTIONS

D'EMPLOI
Usage externe seulement, selon la prescription dumédecin.

EFFETS INDÉSIRABLESL'utilisation prolongée sur des ulcères et dermitesulcéreuses peut provoquer un eczéma allergique de
contact.

M-Terbinafine - Terbinafine creme

INSTRUCTIONS FOR USE

PROPRIETES :
La terbinafine est un antifongique topique

à large spectre de la classe des allylamines. Active sur les dermatophites

(épidermophyton, microsporum, trichophyton...), les levures (candida, malassezia

furfur, pityrosporum orbiculaire...).

INDICATIONS

:
Traitement des infections de la peau dues à des dermatophytes aussi

bien qu'a des infections à levures telles que candida et Pityriasis versicolor du

a malassezia furfur.

POSOLOGIE :
La partie

à traiter sera nettoyée et séchée avant l'application de

M-Terbinafine crème. Appliquer la crème le soir sur et autour de la zone

infectée en une couche fine et masser légèrement.
En cas

d'intertrigo (sous-mammaire, interdigital, inter-fessier, inguinal) couvrir la partie

traitée avec une gaze, specialement durant la nuit.
Appliquer la crème

durant au moins 2 semaines.

CONTRE-INDICATIONS :Hypersensibilité au produit.

INTERACTIONS

:
Aucune.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :Eviter le contact avec les yeux.
En cas de candidose il est conseillé

d'utiliser du savon neutre.

EFFETS INDESIRABLES

:
Rare apparition de prurit ou d'érythème.

M-Amoxicilline 125mg - Amoxicilline poudre pour sirop



INSTRUCTIONS FOR USE

PROPRIETES :Antibiotique bactéricide de la famille des bêtalactamines.Activité liée à l'inhibition de la synthèse des

protéines des parois cellulaires microbiennes.
Actif sur les streptocoques,

pneumocoques, gonocoques, colibacilles, shigelles, salmonelles,

hémophylus.

INDICATIONS :Infections respiratoires, O.R.L ou stomatologiques.
Infections rénales,

urogénitales.

POSOLOGIE :
Verser de

l'eau bouillie refroidie jusqu'au trait du flacon ; en rajouter

après avoir bien agité, si nécessaire.
La présentation

à 125mg/5ml est recommandée chez les bébés de moins de 30

mois.
Alors la posologie usuelle est de 25 à 50mg / kg / jour, soit de 2

à 4 mesures de 5ml par jour selon le poids. Peut être pris

indifféremment avant, pendant ou après les repas.
CONTRE-INDICATIONS :
Allergie aux pénicillines et aux

céphalosporines.
Mononucléose infectieuse.
INTERACTIONS :
En cas d'association avec

l'allopurinol : risques d'accidents cutanés.
PRECAUTION D'EMPLOI :
Avant tout traitement,

vérifier l'absence d'allergie aux pénicillines et aux

céphalosporines.

EFFETS INDESIRABLES :Accidents allergiques.

M-Amoxicilline 250mg - Amoxicilline poudre pour sirop



INSTRUCTIONS FOR USE

PROPRIETES :Antibiotique bactéricide de la famille des bêtalactamines.Activité liée à l'inhibition de la synthèse des

protéines des parois cellulaires microbiennes.
Actif sur les streptocoques,

pneumocoques, gonocoques, colibacilles, shigelles, salmonelles, hémophylus.
INDICATIONS :
Infections respiratoires, O.R.L ou

stomatologiques.
Infections rénales, urogénitales.
POSOLOGIE :
Verser de l'eau bouillie refroidie

jusqu'au trait du flacon ; en rajouter après avoir bien agité, si

nécessaire.
La présentation à 250mg/5ml est recommandée

chez les bébés de plus de 30 mois.
Alors la posologie usuelle est de 25

à 50mg / kg / jour, soit de 2 à 4 mesures de 5ml par jour selon le poids.

Peut être pris indifféremment avant, pendant ou après les repas.
CONTRE-INDICATIONS :
Allergie aux

pénicillines et aux céphalosporines.
Mononucléose infectieuse.

INTERACTIONS :
En cas d'association avec

l'allopurinol : risques d'accidents cutanés.
PRECAUTION D'EMPLOI :
Avant tout traitement,

vérifier l'absence d'allergie aux pénicillines et aux

céphalosporines.

EFFETS INDESIRABLES :Accidents allergiques

M-Amoxicilline 500mg - Amoxicilline gelule

INSTRUCTIONS FOR USE

PROPRIETES :Antibiotique bactéricide de la famille des bêtalactamines.Activité liée à l'inhibition de la synthèse des

protéines des parois cellulaires microbiennes.
Actif sur les streptocoques,

pneumocoques, gonocoques, colibacilles, shigelles, salmonelles, hémophylus.
INDICATIONS :
Infections respiratoires, O.R.L ou

stomatologiques.
Infections rénales, urogénitales.
POSOLOGIE :
La présentation à 500mg est

recommandée chez les adultes et enfants de plus de 6 ans.
Alors la posologie

usuelle est de 25 à 50mg / kg / jour, soit 2 à 4 gélules par jour,

sans dépasser 3g par jour. Peut être pris indifféremment avant, pendant

ou après les repas.

CONTRE-INDICATIONS :Allergie aux pénicillines et aux céphalosporines.
Mononucléose

infectieuse.

INTERACTIONS :
En cas

d'association avec l'allopurinol : risques d'accidents cutanés.
PRECAUTION D'EMPLOI :
Avant tout traitement,

vérifier l'absence d'allergie aux pénicillines et aux

céphalosporines.

EFFETS INDESIRABLES :Accidents allergiques.

M-Ciprofloxacine 500mg - Ciprofloxacine comprimé

INSTRUCTIONS FOR USE

PROPRIETES :
Antibiotique bactéricide de la famille des

fluoroquinolones.
Son spectre d'activité est plus large que celui des

aminoglycosides et des autres fluoroquinolones.
Il est très actif sur :

Colibacilles, Klebsielles, Proteus, Salmonelles, Shigelles, Yersinia, Haemophilus,

Neisseria, Campilobacter, Vibrio, Staphylocoques, Mycoplasma, Legionella.
INDICATIONS :
Chez l'adulte, dans les infections

génito-urinaires, intestinales, ORL, pulmonaires et ostéo-articulaires dues

à des germes sensibles à la ciprofloxacine.
Exceptionnellement chez

l'enfant.

POSOLOGIE :
Avaler les

comprimés au cours des repas.
Infection génito-urinaire

compliquée, ostéo-articulaire, intestinale, bronchique ; sinusite, otite :

1 à 3 comprimés par jour, à répartir en 2 à 3

prises par jour.
Infection génito-urinaire non compliquée :
1/2

comprimé 2 fois par jour, matin et soir.

CONTRE-INDICATIONS :
Hypersensibilité au produit. Grossesse, allaitement, enfant de moins de 5 ans.
INTERACTIONS :
Les pansements gastriques, le sucralfate, le

fer diminuent l'absorption de la ciprofloxacine.
Les anticoagulants oraux, la

théophylline, voient leurs effets augmentés en présence de la

ciprofloxacine.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :Boire de l'eau abondamment pendant le traitement.
Eviter l'exposition

au soleil.
Utiliser avec prudence chez les patients ayant des

antécédents d'épilepsie.
A l'apparition de signes de

tendinite, arrêter le traitement et consulter le médecin.
EFFETS INDESIRABLES :
Parfois des troubles digestifs,

cutanés, musculaires, articulaires et neurologiques.

M-Clarithro 250mg - Clarithro comprimé

INSTRUCTIONS FOR USE

PROPRIETES :
Antibiotique

antibactérien dérivé de l'Erythromycine, de la famille des

macrolides.
Actif sur les Streptocoques, Staphylocoques méti-S, Helicobacter

pylori, Campylobacter jejuni, Corynebacterium diphteria, Mycoplasma pneumonia, Chlamydia,

Legionella, Moraxella, Neisseria,Treponema, Haemophilus.
INDICATIONS :
En cas d'allergie aux bétalactamines.

Infections respiratoires et O.R.L.
Infections rénales,

urogénitales ou gynécologiques.
Infections dermatologiques,

stomatologiques.
Prophylaxie de rechute de RAA (Rhumatisme Articulaire Aigu).
POSOLOGIE :
Angines, Infections stomatologiques,

Infections cutanées bénignes: 500mg/j en 2 prises.
Infections

bronchiques: 500mg à 1.000mg/j en 2 prises.
Sinusites aiguës et

pneumopathies: 1.000mg/j en 2 prises.
Eradication de l'Helicobacter en cas de

maladie gastroduodénale: M-Clarithromycine 500mg matin et soir, associé

à l'Amoxicilline 1.000mg matin et soir et l'Oméprazole 20mg matin et

soir, durant 7 jours. Puis continuer l'Oméprazole par 20mg/j pendant 3 semaines

en cas d'ulcère duodénal évolutif ou 3 à 5 semaines en cas

d'ulcère gastrique

évolutif.
CONTRE-INDICATIONS :
Allergie aux macrolides.
Certaines

associations médicamenteuses (cf. ci-dessous)
INTERACTIONS :
Associations contre-indiquées :

Alcaloïdes de l'ergot de seigle (ergotamine, dihydroergotamine), cisapride,

mizolastine, pimozide, bépridil, anti-histaminiques non -sédatifs.Associations déconseillées: Tacrolimus, Halofantrine, Colchicine, les

statines, Cabergoline, Pergolide, Ebastine, Toltérodine, Carbamazépine,

Théophylline et Aminophylline.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

:
Insuffisance hépatique, grossesse et allaitement.
EFFETS INDESIRABLES :
Manifestations digestives

fréquentes : diarrhées, nausées, vomissements, douleurs

gastriques.
Rares manifestations allergiques.

CECI EST

UN MEDICAMENT
NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS
Conservation dans

un endroit sec et frais

M-Cotrimoxazole - Cotrimoxazole Suspension Buvable

INSTRUCTIONS FOR USE

PROPRIÉTÉS
Anti-infectieux associant un sulfamide,

le Sulfaméthoxazole, et une
pyrimidine, le Triméthoprime.C'est un bactériostatique actif sur Staphylocoques, Streptocoques,Proteus, Salmonelles, Shigelles, Haemophilus, Vibrio, Neisseria.
INDICATIONS
Infections dues à des germes sensibles au

cotrimoxazole, en particulier
dans leurs manifestations respiratoires, ORL,

uro-génitales.
Certaines infections digestives comme la typhoïde.
POSOLOGIE
30mg / Kg de Sulfaméthoxazole et 6mg / Kg de

Triméthoprime par jour,
répartis dans la journée.
Adulte :

Utiliser de préférence la forme comprimé à 480mg.
Enfant :

3 à 6 mesures de 5ml par jour.
Nourrisson : 1 à 4 mesures de 5ml par

jour.

CONTRE-INDICATIONS
Allergie aux composants et en

particulier aux sulfamides.
Déficit en G6PD.
Nouveau-né.
INTERACTIONS
L'association avec le méthotrexate est

contre-indiquée : il y a augmentation de la toxicité hématologique du

produit.
L'association avec la Pyrimethamine peut provoquer un déficit en

acide folique et entraîner une anémie mégaloblastique.
Les

anticoagulants de type coumariniques, les antidiabétiques de type

sulfonylurée et les phénytoïnes sont potentialisés en cas

d'association avec le Cotrimoxazole.

PRÉCAUTIONS

D'EMPLOI
Prévenir le médecin en cas d'insuffisance

rénale ou hépatique ou d'antécédents

hématologiques.
Un contrôle sanguin

M-Ketoco 200mg - Ketoco 200mg comprimé

INSTRUCTIONS FOR USE

PROPRIETES

:
Antifongique oral.
Le Ketoconazole est un antifongique à usage

systémique de la classe des imidazolés.
Actif sur les Candida,

Torulopsis, Cryptococcus, Pityrosporum; Blastomyces, Histoplasma, Coccidioides,

Paracoccidioides; Geotrichum, Drechslera longirostrata; Epidermophyton; agents des mycoses

sous-cutanées; Petriellidium boydii, Hendersonula Toruloidea, Madurella;

Basidiobolus ranarum; Fonsecaea pedrosoi.

INDICATIONS

:
Traitement des infections systémiques et viscérales. Prévention des affections mycosiques chez les immuno-déprimés.Traitement des infections cutanéomuqueuses lorsque les infections ne peuvent

être traitées localement ou en cas de résistance aux antifongiques

habituels.

POSOLOGIE :
Avaler un

comprimé durant le repas.
La posologie habituelle est de 1 comprimé de

M-Ketoconazole par jour en 1 seule prise. En cas de mycoses profondes la dose sera

portée à 2 comprimés par

jour.
CONTRE-INDICATIONS :
Hypersensibilité au produit.
INTERACTIONS :
Association

déconseillée avec: Tacrolimus, Atorvastatine, Simvastatine,

Cérivastatine, Astémizole, Terfénadine, Mizolastine, Cisapride,

Bépridil, Pimozide, Triazolam et Névirapine.
PRECAUTIONS D'EMPLOI :
Déconseillé pendant de

la grossesse et la période d'allaitement.

EFFETS

INDESIRABLES :
Rares troubles digestifs, nausées, diarrhées,

céphalées et vertiges, altération du goût et réactions

cutanées.
Et lors des traitements à doses élevées,

impuissance et diminution de la libido.

CECI EST UN

MEDICAMENT
NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS
Conservation dans un

endroit sec et frais

M-Oflox 200mg - Oflox 200 mg comprimé

INSTRUCTIONS FOR USE

PROPRIETES

:
Antibiotique de la famille des quinolones du groupe des

fluoroquinolones. Son spectre d'activité est plus large que celui des

aminoglycosides et des autres fluoroquinolones.
Il est très actif sur :

Colibacilles, Klebsielles, Proteus, Salmonelles, Shigelles, Yersinia, Haemophilus,

Neisseria, Campilobacter, Vibrio, Staphylocoques, Mycoplasma, Legionella.
INDICATIONS :
Chez l'adulte, dans les infections

génito-urinaires, intestinales, ORL, pulmonaires et ostéo-articulaires dues

à des germes sensibles à l' Ofloxacine.
POSOLOGIE :
Avaler les comprimés au cours des repas.

Cystites aiguës non compliquées de la femme de moins de 65 ans : 2

comprimés en prise unique.
Cystites récidivantes , âge

supérieur à 65 ans : 2 comprimés par jour pendant 5 jours.Infection génito-urinaire compliquée, ostéo-articulaire,

intestinale, bronchique, sinusite, otite :
2 comprimés par jour pendant 5

jours, à répartir en 2

prises.
CONTRE-INDICATIONS :
Hypersensibilité au produit. Grossesse, allaitement, enfant de moins de 6 ans.
INTERACTIONS :
Les anticoagulants oraux, la

Théophylline, voient leurs effets augmentés en présence de l'

Ofloxacine.
Les pansements gastriques, le Sucralfate, le Fer, le Zinc diminuent

l'absorption de l' Ofloxacine.

PRECAUTIONS

D'EMPLOI :
Boire de l'eau abondamment pendant le traitement.Eviter l'exposition au soleil.
Utiliser avec prudence chez les patients

ayant des antécédents d'épilepsie.
A

l'apparition de signes de tendinite, arrêter le traitement et consulter le

médecin.

EFFETS INDESIRABLES :
Parfois

des troubles cutanés, musculaires, digestifs, articulaires et neurologiques.
CECI EST UN MEDICAMENT
NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES

ENFANTS
Conservation dans un endroit sec et frais

Bevitazinc - Bevitazinc comprime

INSTRUCTIONS FOR USE

PROPRIETES :
Association de 11 vitamines et de 5

oligo-éléments impliqués dans tous les systèmes enzymatiques et

antioxydants.

INDICATIONS :Supplémentation pour aider au maintien de la santé et de la

vitalité ou corriger certains déficits liés à une alimentation

insuffisante ou déséquilibrée, lors d'une convalescence, en

période de croissance, de fatigue générale.
POSOLOGIE :
Avaler 1 à 2 comprimés par jour au

milieu du repas.
Le traitement sera de un mois.
CONTRE-INDICATIONS :
Aucune à dose normal.
INTERACTIONS :
Aucune à dose normal.
PRECAUTIONS D'EMPLOI :
Durant la

période de grossesse et d'allaitement ne pas dépasser 6 000 UI par jour de

vitamine A (apports alimentaires inclus).
Ne pas associer à d'autres

multivitamines ou oligo-éléments.

EFFETS

INDESIRABLES :
Aucun aux doses recommandées.
NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS
Conservation dans un

endroit sec et frais

Ferozinc B12 - Ferozinc B12 Gelule

INSTRUCTIONS FOR USE

PROPRIETES :
Préparation anti-anémique

par apport de fer et d'acide folique.
L'association à de la vitamine B12

et du zinc participe au processus de formation de l'hémoglobine.
INDICATIONS :
Anémie par carence en fer et/ou en acide

folique.
Traitement chez la femme enceinte, pour prévenir diverses carences.
POSOLOGIE :
Avaler de préférence

durant le déjeuner.
Traitement curatif : 1 à 2 gélules par

jour.
Traitement préventif : 1 gélule par jour à partir du

4ème mois de grossesse. Le traitement durera 3 à 6 mois pour corriger

l'anémie et restaurer les réserves en fer.
CONTRE-INDICATIONS :
Surcharge en fer, anémie par

insuffisance médullaire, anémie réfractaire et en particulier

anémie normo ou hypersidérémique telle que thalassémie.
INTERACTIONS :
La consommation importante de

thé inhibe l'absorption de fer.
Dû à des problèmes

d'absorption, prendre à distance de plus de 2 heures : cyclines,

fluoroquinolones, pénicillamine, sels de magnésium, d'aluminium et de

calcium, thyroxine.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :
A

éviter pendant la période d'allaitement.
EFFETS INDESIRABLES :
Coloration habituelle des selles en gris

noir ou noir.
Possibilité de nausées, constipation ou

diarrhées.

M-Calcium Fort - Calcium Fort comprimé

INSTRUCTIONS FOR USE

PROPRIETES :
Le

carbonate de calcium est reconnu comme étant la forme de calcium la plus naturelle

et la mieux absorbée.
Après absorption digestive, on constate une

augmentation du calcium osseux sans fixation extraosseuse.
INDICATIONS :
Apport en calcium à forte dose, en période

de croissance, de grossesse, d'allaitement ou après une fracture

osseuse. Rachitisme. Traitement de tétanie chronique. Traitement d'appoint des

ostéoporoses.
Calcithérapie y compris chez le diabétique.
POSOLOGIE :
En général, croquer 2

comprimés par jour.
CONTRE-INDICATIONS : Hypercalcémie.
Hypercalciurie.

INTERACTIONS

:
L'association de calcium avec des digitaliques doit se faire sous

surveillance médicale, d'autant plus si le patient prend le calcium avec de la

vitamine D.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :
En

traitement long ou en association avec la vitamine D, il est conseillé de faire

contrôler le taux de calcium sanguin.

M-Calcium Plus - Calcium Plus comprimé

INSTRUCTIONS FOR USE

PROPRIÉTÉS :Apport vitamino D-calcique.
Le carbonate de calcium est reconnu comme étant

la formede calcium la plus naturelle et la mieux absorbée. Après absorption

digestive, on constate une augmentation du calcium osseux sans fixation extraosseuse.La vitamine D améliore l'absorption du calcium et sa fixation sur le tissu

osseux.
L'apport vitamino D-calcique corrige l'hyperparathyroïdiesénile secondaire.

INDICATIONS :
M-Calcium Plus

corrige les carences vitamino-calciques
chez les sujets âgés.
Apport

vitamino-calcique associé aux traitements spécifique de

l'ostéoporose, chez les patients carencés ou à haut risque de

carence vitamino D-calcique.

POSOLOGIE :
Un

comprimé le matin, un comprimé le soir.
Réservé à

l'adulte.

CONTRE-INDICATIONS :
Hypercalcémie,

hypercalciurie, calcul rénal calcique.

INTERACTIONS :L'association de M-Calcium Plus avec des digitaliques et
des

diurétiques thiazidiques doit se faire sous surveillance médicale.Décaler la prise de 3 heures en cas d'association avec lestétracyclines, fluorures ou biphosphanates.

PRÉCAUTIONS

D'EMPLOI :
M-Calcium Plus peut-être utilisé durant la

grossesse à
raison de 1 comprimé par jour.

EFFETS

INDÉSIRABLES :

Nausées, troubles digestifs.

M-Tramad 50mg - Tramad 50mg gelule

INSTRUCTIONS FOR USE

PROPRIETES :
Analgésique opioïde d'action

centrale, efficace dû à la synergie d' effet opioïde et

monoaminergique central.

INDICATIONS :Traitement chez l'adulte et l'enfant de plus de 15 ans, des douleurs

modérées à intenses.

POSOLOGIE

:
Douleurs aiguës: La dose d'attaque est de 2 gélules.Douleurs chroniques: La dose d'attaque est d' 1 ou 2 gélules.Les doses seront suivies de 1 à 2 gélules toutes les 4 à 6

heures sans dépasser 400 mg/j.

CONTRE-INDICATIONS

:
Hypersensibilité au produit.
Epilepsies traitées non

contrôlées.
Insuffisance respiratoire et hépatocellulaire

sévère.

INTERACTIONS :L'association avec la Carbamazépine et les IMAO (Iproniazide,

Moclobémide, Toloxatose, Sélégiline, Linézolide...) est

à éviter.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :A éviter durant la grossesse et l'allaitement en cas de traitement

prolongé.
La prise d'alcool est déconseillé.
EFFETS INDESIRABLES :
Possibilités de nausées,

vertiges, vomissements; et de façon plus occasionnelle: somnolence, constipation et

sécheresse de la bouche.

CECI EST UN MEDICAMENTNE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS
Conservation dans un endroit sec et

frais

M-Valpro LP 200mg - Valpro LP 200mg comprime

INSTRUCTIONS FOR USE

PROPRIETES :
M-Valpro LP

est utilisé pour traiter l'épilepsie généralisée ou

partielle, les crises épileptiques de type "petit mal ".
INDICATIONS :
Chez l'adulte et l'enfant:
Traitement

des épilepsies généralisées ou crises partielles avec ou sans

généralisation secondaire.
Chez l'enfant:
Utilisé en

prévention des convulsions fébriles quand les facteurs de risques de

récidives sont présents.

POSOLOGIE

:
Avaler les comprimés pendant les repas.
Posologie

habituelle:
Adulte : 20 à 30mg/Kg par jour, à répartir en 2

prises.
Enfant : 30mg/Kg par jour, à répartir en 2 prises. Débuter par des doses faibles pendant 2 à 3 jours, puis augmenter

progressivement la dose jusqu'à obtention de la dose efficace.
CONTRE-INDICATIONS :
Hypersensibilité au valproate. Antécédent hépatique (aiguë ou chronique) et porphyrie

hépatique.
La prise de Méfloquine est contre-indiquée.
INTERACTIONS :
L'association avec

Carbamazépine, Lamotrigine, Phénobarbital, Carbipénèmes,

Felbamate, Topiramate et Phénytoïne est déconseillée.
PRECAUTIONS D'EMPLOI :
Le valproate doit

être utilisé avec précaution durant la période de grossesse et

d'allaitement.

EFFETS INDESIRABLES :Possible cas de troubles digestifs, fatigue, somnolence, vertiges,

céphalée.

CECI EST UN MEDICAMENT
NE PAS

LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS
Conservation dans un endroit sec et frais

M-Chloramphenicol - Chloramphenicol Collyre

INSTRUCTIONS FOR USE

PROPRIÉTÉS
Antibiotique

bactériostatique à large
spectre, de la famille des

Phénicolés.

INDICATIONS
Infections de

l'oeil ou de ses annexes,
dues à des germes sensibles auchloramphénicol.
Ulcération de la cornée, conjonctivitebactérienne, blépharite, dacryocystite.

POSOLOGIEInstiller 2 gouttes dans le coin intérieur
de l'oeil 3

à 6 fois par jour, à intervalle
régulier.
CONTRE-INDICATIONS
Hypersensibilité au produit.Grossesse, allaitement.
Antécédents d'insuffisance

médullaire.
Chez le nouveau-né de moins de 6 mois.
INTERACTIONS
L'association avec d'autres

préparations
ophtalmiques contenant un
antibiotique est

déconseillée.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOIL'utilisation du collyre de façon prolongée
ou à

petites doses répétées est à
proscrire car pouvant

entraîner des
effets indésirables, comme l'aplasiemédullaire.

EFFETS INDÉSIRABLESPossibilité de réactions allergiques
telles que démangeaison,

rougeur et
gonflement non présents avant le
traitement.

M-Cipro 3% - Cipro 3% collyre

INSTRUCTIONS FOR USE

PROPRIETES :Antibiotique de la famille des fluoroquinolones.
INDICATIONS :
Traitement de la conjonctivite.

Blépharites dus à des germes sensibles, ulcères et abcès

cornéens.

POSOLOGIE :
Conjonctivite: Les 2 premiers jours, instiller 1 ou 2 gouttes de M-Ciprofloxacine dans le cul-de-sac

conjonctival de l'oeil (des yeux) malade(s), toutes les 2 heures pendant la

journée; puis 1 ou 2 gouttes toutes les 4 heures jusqu'à disparition de

l'infection.
Abcès cornéens:
Le premier jour, instiller 2

gouttes dans l'oeil (les yeux) malade(s), toutes les 15 minutes pendant les 6

premières heures; puis 2 gouttes toutes les 30 minutes jusqu'à la fin de

la journée.
Le second jour, instiller 2 gouttes dans l'oeil (les yeux)

malade(s), toutes les heures.
Du 3ème au 14ème jour, instiller 2 gouttes

dans l'oeil (les yeux) malade(s), toutes les 4

heures.
CONTRE-INDICATIONS :
Hypersensibilité aux quinolones et

aux composants du produit.

INTERACTIONS :
En

cas de traitement concomitant avec d'autres collyres, instiller à 15 minutes

d'intervalle.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :Eviter le port de lentilles de contact.
En cas d'éruption

cutanée ou de signe d'hypersensibilité, arrêter le traitement

et consulter votre médecin.
Déconseillé en période

de grossesse et d'allaitement.

EFFETS INDESIRABLES

:
Possible sensation de brûlures ou de gênes oculaires.
CECI EST UN MEDICAMENT
NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES

ENFANTS
Conservation dans un endroit sec et frais

M-Timol 0,5% - Timol 0,5% collyre

INSTRUCTIONS FOR USE

PROPRIETES :
Antiglaucomateux, bêtabloquant non

cardiosélectif.

INDICATIONS :Traitement de l'hypertonie intraoculaire et du glaucome chronique à

angle ouvert.

POSOLOGIE :
En cas de relais

d'un autre collyre antiglaucomateux, le traitement antérieur doit être

arrêté une journée entière.
Instiller 1 goutte

de M-Timol dans l'oeil (les yeux) malade(s) matin et
soir.
CONTRE-INDICATIONS :
Hypersensibilité au produit.Asthme ou BPCO (broncho-pneumopathies chroniques obstructives), blocs

auriculoventriculaires des second et troisième degrés non appareillés,

l'angor de prinzmetal, maladie du sinus, bradycardie (< 45 à 50

contractions/minute), maladie de Raynaud et les troubles circulatoires

périphériques.

INTERACTIONS :Risque de

M-Tobradexa - Tobradexa collyre

INSTRUCTIONS FOR USE

PROPRIETES :
Association de corticoïde et

d'antibactérien.
Le Tobramycine est un antibiotique de la famille des

aminosides.
Le Dexaméthasone est un anti-inflammatoire stéroïdien

puissant.

INDICATIONS :
Traitement

post-chirurgical ophtalmologique à visée anti-inflammatoire et

antibactérien.

POSOLOGIE :
Adulte:

Instiller 1 goutte dans le cul-de-sac conjonctival, toutes les 4 à 6 heures en

fonction des symptômes.

CONTRE-INDICATIONS

:
Hypersensibilité au produit.
En cas de kératite

mycosique, de kératite herpétique épithéliale dendritique et de

kératoconjonctivite virale épidémique au stade précoce.
INTERACTIONS :
Avec les médicaments non

anti-arythmiques, donnant des torsades de pointes (Astémizole, Bépridil,

Erythromycine IV, Halofantrine, Pentamidine, Sparfloxacine, Sultopride, Terfénadine,

Vincamine), les autres

Paludoxine - Paludoxine comprime

INSTRUCTIONS FOR USE

PHARMACOLOGIE
Antipaludéen schizonticide.Chimiothérapie du paludisme en une seule prise.
Ses deux composants ont une

action synergique qui s'exerce en bloquant des enzymes qui interviennent dans la

biosynthèse de l'acide folinique chez les hématozoaires.
INDICATIONS
Accès palustres en particulier à

Plasmodium Falciparum en cas de résistance aux amino-4-quinoléines ou en cas

de contre-indication aux autres
antipaludéens.
CONTRE-INDICATIONS
Intolérance aux sulfamides.
Atteinte

grave du parenchyme hépatique. Insuffisance rénale confirmée.Grossesse et Allaitement.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOILa dose indiquée doit être prise en une seule fois et ne doit pas

être dépassée.
Dans l'éventualité où le

traitement nécessite de renouveler plusieurs fois la dose, un délai minimum

de 8 jours doit être respecté entre chaque prise de

KOOK Expectorant Adulte - KOOK Expectorant sirop adulte

INSTRUCTIONS FOR USE

PROPRIÉTÉS
La carbocistéine fluidifie les

sécrétions bronchiques et favorise ainsi l'expectoration.
INDICATIONS
KOOK Expectorant est indiqué dans les toux

grasses, les troubles de la sécrétion bronchique, les bronchites

aiguës.

POSOLOGIE
Adulte : 3 cuillères

à café 3 fois par jour.

CONTRE-INDICATIONSAllergie à la carbocistéine.
Toux sèche.
INTERACTIONS
Aucune.

PRÉCAUTIONS

D'EMPLOI
Ne pas associer à un anti-tussif.
En cas de

diabète, d'ulcère peptique.

EFFETS

INDÉSIRABLES
Parfois intolérance digestive

KOOK Expectorant Enfant/Nourrisson - KOOK Expectorant Enfant/Nourrisson

INSTRUCTIONS FOR USE

PROPRIÉTÉS
La carbocistéine

fluidifie les sécrétions bronchiques et favorise ainsi

l'expectoration.

INDICATIONS
KOOK Expectorant est

indiqué dans les toux grasses, les troubles de la sécrétion

bronchique, les bronchites aiguës.

POSOLOGIENourrisson de plus de 1 mois : 20 à 30mg / Kg / jour.
Enfant de moins de 5

ans : 2 cuillères à café par jour.
Enfant de plus de 5 ans : 3

cuillères à café par jour.
Adulte : utiliser plutôt la

présentation adulte.

CONTRE-INDICATIONS
Allergie

à la carbocistéine.
Toux sèche.
INTERACTIONS
Aucune.

PRÉCAUTIONS

D'EMPLOI
Ne pas associer à un anti-tussif.
En cas de

diabète, d'ulcère peptique.

EFFETS

INDÉSIRABLES
Parfois intolérance digestive.

M-Salbutamol - Salbutamol suspension pour inhalation

INSTRUCTIONS FOR USE

PROPRIÉTÉS :
En inhalation

c'est un bronchodilatateur à action rapide et
de courte durée.
POSOLOGIE :
1 à 2 inhalations en cas de crise

d'asthme ; En prévention de l'asthme d'effort 1 à 2 inhalations 15mn

avant l'exercice ; 2 inhalations 4 fois par jour lors de bronchopneumopathie chronique

obstructive ; Ne pas dépasser 15 inhalations par 24 heures.

MODE

D'EMPLOI :
1- Retirer le capuchon et bien secouer l'inhalateur2- Vider les poumons
3- Mettre l'embout entre les lèvres, inspirer

profondément et en même temps presser sur le flacon
4- Retirer

l'inhalateur de la bouche, tout en retenant la respiration pendant 10 secondes
CONSEILS D'ENTRETIEN DE L'APPAREIL :
Il est

conseillé de nettoyer régulièrement l'appareil. Pour
cela,

enlever le flacon métallique ; les parties en plastique seront lavées

à l'eau savonneuse, bien rincées puis séchées et

ré-assemblées avec le flacon métallique.
CONTRE-INDICATIONS :
Intolérance à ce

médicament.

PRÉCAUTION D'EMPLOI :Prévenir le médecin si le traitement ne soulage pas de lacrise d'asthme malgré l'augmentation de la dose ; La prise de salbutamol

peut entrainer un résultat positif aux tests de dopage.

EFFETS

INDÉSIRABLES :
Rarement sont observés des tremblements, des

crampes,
des troubles cardio-vasculaires. Dans ce cas, il faut
informer le

médecin.